

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia
wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce

hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność
i stosować odpowiednie środki bioasekuracji
minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków
do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni,
pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych
lub pod szczelnym przykryciem,
uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych,
do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne
oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami
umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.

Hodowco!


Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji
(lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,
wójt/burmistrz/prezydent miasta)
podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody;
objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów;
duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

Uwaga! HPAI

**ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ
W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA
PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)**



Nie karm drobiu na zewnątrz
budynków inwentarskich.

Pozostaw ptaki w przeznaczonych
do tego celu pomieszczeniach
bez możliwości swobodnego poruszania się
po otwartym wybiegu.

Nie wykorzystuj do pojenia drobiu
wody ze zbiorników,
do których mają dostęp dzikie ptaki.

Po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi ptakami
umyj ręce wodą z mydłem.

Stosuj maty dezynfekcyjne
w wejściach i wyjściach
z budynków, w których
utrzymywany jest drób
oraz przy wjazdach i wyjazdach
z gospodarstwa.

Zabezpiecz budynki,
w których utrzymywany jest drób
oraz paszę przed dostępem
zwierząt dzikich, w tym ptaków.

Obserwuj stan zdrowia ptaków.
O wszelkich niepokojących objawach
natychmiast powiadom
lekarza weterynarii.